

# Solist



## Greičiausiai odele suformuojanti ankstyvoji bulvė



- ✓ *garantuotas pelnas per trumpiausią laiką*
- ✓ *graži lygi odele, atspari šašams*
- ✓ *tinkama skutimui*
- ✓ *tinkama pakavimui ir tiesioginiams pardavimams*

### Gumbų savybės

|               |                |
|---------------|----------------|
| Suvir. tipas: | B              |
| Ankstyvum.:   | I.ankstyva     |
| Forma:        | apvali-ovalinė |
| Minkš.spalv.: | švies.geltona  |
| Žievelė:      | geltona, lygi  |
| Akutės:       | lygios         |

### Atsparumas

|                |           |
|----------------|-----------|
| Y-virusas:     | vidutinis |
| Lapų susis.v.: | didelis   |
| Rizoktonija:   | I.idelis  |
| Bulvių maras:  | didelis   |
| Rauplės:       | didelis   |
| Nematodai:     | Ro1Ro4    |



# Solist



## Sodinimas

### Sėklos paruošimas:

Ankstyvam derliui rekomenduojama sudaiginti laikantis daiginimo technologijos.

### Beicavimas:

Rekomenduojama beicuoti nuo rizoktonijos

| Paskirtis        | Lenga žemė               | Sunki žemė               | Sodinimo gylis ir vagos form.                    |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Ankstyvom bulvėm | 34 cm<br>39.000 vnt../ha | 32 cm<br>42.000 vnt../ha | Įprastinis sodinimo gylis, gerai suformuota vaga |

Sodinimo atstumas cm esant standartinei 35-55 mm sėklai ir 75 cm tarpui tarp vagų

Reikia atsižvelgti į maistinių medžiagų kiekį gautą su mėšlu!

## Tręšimas

50 t/ha derliui gauti

| Paskirtis        | Azotas (N)    | Fosforas (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Kalis (K <sub>2</sub> O)                                                                           | Magnis (MgO) |
|------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ankstyvom bulvėm | 140-160 kg/ha | 80-100 kg/ha                              | 250-300 kg/ha<br>naudoti kalio trąšas be chloridų, kad būtų užtikrintas ankstyvas krakmolo kiekis; | 80-100 kg/ha |

## Rūšiavimas ir valymas

švelnus valymas; venkite gumby temperatūros <10°C; prieš valydami patikrinkite žievelės stiprumą.

## Sandėliavimas

Ilgas ramybės periodas, tinka ilgam sandėliavimui

Čia pateiktos instrukcijos pagrįstos patirtimi ir stebėjimais, tačiau kiekvieno ūkio specifinės sąlygos gali skirtis, todėl bet koku atveju rekomenduojame pasikonsultuoti su mūsų darbuotoju, atsakingu už jūsų regioną



Speise  
consumption  
consommation  
patata de consumo



beste Schäleignung  
best peeling quality  
pour peler  
por pela



Chips  
crisps  
chips  
patatas fritas



Pommes frites  
French fries  
pommes frites  
patatas fritas alagadas



Trockenprodukte  
dehydrated products  
produits déshydratés  
productos deshidratados



Stärke  
starch  
féculé  
fécula

sehr früh

first early  
trés hâtive  
muy temprana

mittelspät

maincrop  
demi-tardive  
semi tardia

Kochtyp/ cooking type/ groupe culinaire

A fest kochend  
firm cooking  
chair ferme

B vorwiegend fest kochend  
mainly firm cooking  
assez chair ferme

C mehlig kochend / flowery cooking / farineuse

